

CL-ODIN 43 SC-1L-LABEL-20120628

SIZE:278(W)X138(H)MM

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Tebuconazol, ingrediente activo de ODIN® 43 SC, pertenece al grupo químico de los Triazoles. Evitar que el producto entre en contacto con ojos, piel o ropa. Limpiar el equipo aplicador antes de utilizarlo con otro producto. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Luego de la manipulación del producto, sacarse las ropas y lavarlas muy bien antes de volver a utilizarlas. Durante la manipulación utilizar guantes impermeables, antiparras, overol impermeable y botas de goma. Mantener alejado del alcance de los niños. Almacenar en envases originales debidamente cerrados en un lugar que sea cerrado, fresco, seco y bien ventilado.

**Riesgos ambientales:** No tóxico para peces, aves y abejas. Se recomienda no verter en drenajes ni cursos de agua.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS**

**LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD**

**REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON**

**INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA**

**NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE**

**ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

**LOS MANIPULADORES, CARGADORES Y PERSONAL QUE MANIPULA LA FRUTA TRATADA EN POST-COSECHA,**

**DEBEN UTILIZAR ROPA DE PROTECCIÓN**

**Instrucciones de Triple Lavado de Envases:** Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfere el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

**Síntomas de Intoxicación:** Producto peligroso si es ingerido, puede causar irritación de la piel y ojos. No tiene síntomas específicos de intoxicación.

**PRIMEROS AUXILIOS: PARA TODOS LOS CASOS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, SE DEBE LLEVAR AL AFECTADO A UN CENTRO ASISTENCIAL LO MÁS RÁPIDO POSIBLE, PRESENTANDO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO AL PROFESIONAL DE LA SALUD A CARGO. Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Conseguir ayuda médica. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Conseguir ayuda médica. **Ingestión:** No inducir al vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Conseguir ayuda médica.

**Antídoto:** No tiene antídoto conocido.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Tratamiento sintomático y de soporte.

**Teléfonos de emergencia:** RITA\_CHILE: 227771994. Rotam de Chile: 222339152

ODIN® es marca registrada de Rotam Agrochemical Co. Ltd.

**ODIN®** 43 SC

**FUNGICIDA**  
Suspensión Concentrada (SC)

Autorización del Servicio  
Agrícola y Ganadero N° 2696

Número de lote:

Fecha de Vencimiento:

**ODIN 43 SC** es un fungicida sistémico, con acción protectora y curativa, para ser usado en los frutales contra enfermedades, tal como se indica en el cuadro de Instrucciones de uso. También puede ser utilizado en pos cosecha como se indica en el cuadro de usos.

#### COMPOSICIÓN

Tebuconazol \* 43% p/v (430 g/L)

Coformulantes c.s.p 100% p/v (1 l)

\* (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 1 Litro**



**Importado y Distribuido por:**  
**Rotam De Chile, Ltd.**  
Providencia 2318 of 31.  
Providencia - Chile.

**Fabricado por:**  
**Rotam Agrochemical Co. Ltd.**  
Unit 6, 26/F Trend Centre,  
No. 29 Cheung Lee Street  
Chai Wan, Hong Kong, China



**CUIDADO**

