

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Grupo Químico: Pirimetanilo pertenece al grupo químico de las anilino pirimidinas. Evitar la ingestión del producto y la inhalación del asperjado de aplicación. Utilizar equipo de protección personal indicado. Proveer de una adecuada ventilación de la zona de manipulación. Asegurar que exista una instalación para lavado de ojos. Lavarse las manos, antebrazos y cara prolijamente luego de haber manipulado el producto y antes de comer, fumar, ir al baño y al término de cada jornada laboral. Durante la preparación utilizar antiparras, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación utilizar antiparras, máscara con filtro, overol impermeable, guantes impermeables y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Síntomas de intoxicación: No se han reportado síntomas locales o sistémicos, con este producto.

Primeros Auxilios: En todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo. **En caso de contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. **En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **En caso de contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de Inhalación:** Traslade al paciente al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato

Antídoto: No tiene antídoto específico conocido.

Tratamiento Médico de Emergencia: En caso de exposición local, el tratamiento debe ser sintomático, luego de realizar una completa descontaminación. En caso de un envenenamiento sistémico, el tratamiento debe ser sintomático y de soporte. No se recomienda la terapia anticonvulsiva.

Riesgo ambiental: Ligeramente tóxico para peces. Prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas. Evitar que sus residuos ingresen a cursos de agua o alcantarillados.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

Instrucciones de Triple Lavado: Vacíe el remanente de producto en el tanque de pulverizado y mantenga el envase en posición de descarga por un mínimo de 30 segundos. Agregue agua hasta 1/4 de la capacidad del envase. Cierre el envase y agite durante 30 segundos. Vierta el agua en el equipo pulverizador. Mantenga verticalmente durante 30 segundos. Realice este procedimiento 3 veces. Perfore el envase para evitar su reutilización. Almacene los envases limpios, secos, sin tapa, en sitio cerrado y techado para entrega en centro de acopio autorizado.

En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 2 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención las 24 hr., convenio CITUC/AFIPA., o a RITA-CHILE: 2 27771994. El teléfono del importador es 2 25604500, Santiago, Chile.

Almacenaje: Almacenar en envases originales, debidamente cerrados y etiquetados, en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de calor o ignición. Mantener bajo llave, separado de cualquier tipo de alimento, bebida o pienso para animales y fuera del alcance de niños o personas inexpertas.

NOTA AL COMPRADOR: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa a consecuencia de su uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

PYRUS® 400 SC
FUNGICIDA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA
(SC)

Lote de fabricación: Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.841
 Fecha Vencimiento:

PYRUS® 400 SC es un fungicida inhibidor de la síntesis de metionina, que controla *Botrytis* y *Venturia*, así como también otras enfermedades, indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

COMPOSICIÓN:
 Pirimetanilo*40% p/v (400 g/L)
 Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1 L)
 *N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO: XX LITRO

Importa y Distribuye:
ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
 El Rosal 4610, Huechuraba, Santiago, Chile.
 ET2841-V004-OS5

Fabricado por:
Yantai Keda Chemical Co., Ltd.
 100 Quanshan Road, Zhaoyuan, Shangdong Province, China.

Arysta LifeScience Benelux SPRL.
 Rue de Renory, 26
 4102 Ougrée - Bélgica.

Arysta LifeScience Colombia S.A.S
 Carrera 2 Este # 15 - 82
 Madrid, Colombia

Arysta LifeScience Ougrée Production sprl.
 Rue de Renory, 26/2
 B-4102 Ougrée, Bélgica

INSTRUCCIONES DE USO:

PYRUS® 400 SC es un fungicida sitio específico, inhibidor de la síntesis de metionina, que controla *Botrytis cinerea* y *Venturia spp.*, así como también otras enfermedades, indicadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Uva vinífera, de mesa y pisquera	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,5 a 2,0 L/ha (130 a 150 cc/100 L de agua)	Se recomienda utilizar PYRUS® 400 SC una vez, dentro de un programa de 3 a 4 tratamientos preventivos (*). Máximo 2 aplicaciones por temporada, a intervalos de 7 a 14 días, resguardando los períodos de carencia.
	Complejo de pudrición ácida		Aplicar al estado de pinta y repetir a los 14 días después, resguardando los períodos de carencia.
Tomate y Tomate de invernadero, Pimentones, Cebolla y Ajo	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,5 a 1,75 L/ha (130 -150 cc/100 L de agua)	Se recomienda utilizar PYRUS® 400 SC una vez, dentro de un programa de 3 a 4 tratamientos preventivos (*). En el caso de uso en invernaderos, cuando la humedad sea superior al 80%, se recomienda ventilar bien para evitar un posible efecto de fitotoxicidad. Máximo 2 aplicaciones por temporada a intervalos de 7 a 14 días.
Frutilla, Frambueso y Arándano	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,0 L/ha	Aplicar desde inicio de floración (30%). Se recomienda utilizar PYRUS® 400 SC una vez, dentro del programa de 3 a 4 tratamientos preventivos (*). Máximo 2 aplicaciones por temporada con un intervalo de 21 días entre las aplicaciones de PYRUS® 400 SC , resguardando los períodos de carencia
Manzano y Peral	Botritis (<i>Botrytis cinerea</i>), Venturia o Sarna del Manzano y del Peral	1,0 L/ha (50 - 70 cc/100 L de agua)	Contra botritis aplicar entre floración y caída de pétalos. Si fuera necesario repetir 7 días antes de la cosecha. Contra Venturia aplicar de puntas verdes hasta fines de floración. Máximo 2 aplicaciones por temporada, a intervalos de 7 a 10 días, resguardando los períodos de carencia.
Manzano	Ojo de buey (<i>Neofabraea alba</i>)		Aplicar en precosecha, desde 30 días antes de cosecha, repitiendo 15 días después. Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días entre las aplicaciones de PYRUS® 400 SC , resguardando los períodos de carencia.
Durazneros, Ciruelos, Nectarinos, Damascos, Almendros	Tizón de la flor (<i>Botrytis cinerea</i>)	2,0 L/ha (135 cc/100 L de agua)	Aplicar desde 40-50% de floración hasta Plena flor o caída de pétalos. Máximo 2 aplicaciones por temporada con un intervalo de 7 a 10 días entre las aplicaciones de PYRUS® 400 SC , resguardando los períodos de carencia.

(*) En rotación con otros fungicidas botriticidas de diferente modo de acción.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que se va a utilizar. Agregar la dosis deseada de **PYRUS® 400 SC** y completar con agua hasta el volumen requerido, manteniendo agitación constante.

Aplicación: Aplicar dosis máximas en condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad y cuando existan condiciones de alta presión de la enfermedad. Se recomienda usar un volumen de agua para la aplicación en Uvas de 1.000 a 1.500 L de agua/ha, dependiendo del sistema de conducción y desarrollo de la vegetación. En Manzano, Peral y Carozos, se recomienda máximo 1.500 L/ha, dependiendo del desarrollo vegetativo del cultivo. En Tomates, Pimentones, Frutilla, Frambuesa y Arándano, se recomienda un mojamiento máximo de 800 L/ha. En Cebolla y Ajos, se recomienda un mojamiento de 800 L/ha cuando se use la dosis/ha y para mojamientos mayores, usar la dosis por concentración.

Compatibilidad: **PYRUS® 400 SC** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y aspersiones de calcio de uso común.

Incompatibilidad: No mezclar con materiales fuertemente alcalinos o productos que contengan aluminio.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico si se usa según las recomendaciones de esta etiqueta.

Tiempo de Reingreso al área tratada (personas y animales): 4 horas después de la aplicación. No permitir el reingreso a la zona tratada, hasta que se haya secado la aplicación. Si se debe reingresar antes del tiempo establecido, se debe utilizar equipo de protección personal adecuado.

Período de Carencia: Uvas: 1 día. Tomates, Pimentones, Cebollas, Frutillas, Frambuesas, Arándanos, Duraznos, Ciruelas, Nectarines, Damascos: 3 días. Ajo, Manzanas y Peras: 7 días. Almendras: 30 días. Para cultivos de exportación atenderse a las exigencias del país de destino.

OTRAS INFORMACIONES: Para prevenir el desarrollo de resistencia, se recomienda alternar o mezclar con fungicidas de diferentes grupos químicos, o diferentes modos de acción. **PYRUS® 400 SC** pertenece al grupo FRAC 9, D1.

©PYRUS es marca registrada.

21 cm.

CUIDADO



35,5 cm.